

# SIMPARICA™ DOZĒŠANAS TABULA

**Lietošana: ieteicamā deva 2-4 mg/kg ķermeņa svara**

Ķermeņa svars (kg)	Tabletes stiprums*	Lietojamo tablešu skaits	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 1x mēnesī</li><li>■ Kucēniem no 8 nedēļu vecuma</li><li>■ Suņiem virs 1,3 kg ķermeņa svara</li></ul>
1,3–2,5 kg	5 mg	1 tablete	
2,5–5 kg	10 mg	1 tablete	
5–10 kg	20 mg	1 tablete	
10–20 kg	40 mg	1 tablete	
20–40 kg	80 mg	1 tablete	

\* mg sarolanera



 **Simparica™**  
(sarolaners) košļājamās tabletes



## PRET ĒRČU, BLUSU UN KAŠĶA ĒRCES INVĀZIJĀM

- Uzticama efektivitāte uz vairāk nekā mēnesi
- Plaša aizsardzība pret ektoparazītiem
- Zema deva aktīvās vielas
- Laba saderība
- Reģistrēts suņiem sākot no 1,3 kg
- Garšīgas tabletes – vienkārši 1x mēnesī
- Bez zināmām blakusparādībām, lietojot ieteicamajā devā.

**Simpatica™** 5 mg košļājamās tabletes suņiem 1,3-2,5 kg  
**Simpatica™** 10 mg košļājamās tabletes suņiem 2,5-5 kg  
**Simpatica™** 20 mg košļājamās tabletes suņiem 5-10 kg  
**Simpatica™** 40 mg košļājamās tabletes suņiem 10-20 kg  
**Simpatica™** 80 mg košļājamās tabletes suņiem 20-40 kg  
**Simpatica™** 120 mg košļājamās tabletes suņiem 40-60 kg

**KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS:** Katra tablete satur: Aktīvā viela: sarolaners 5/10/20/40/80/120 mg. Palīgvielu saraksts: hipromelozes acetāta sukcināts, vidējas pakāpes; laktozes monohidrāts, nātrija cietes glikolāts, koloidālais silīcija dioksīds, magnija stearāts, kukurūzas ciete, konditorejas cukurs, šķidrā glikoze (81,5% cietvielas), kaltētu cūku aknu pulveris, hidrolizēts dārzenu proteīns, A tipa želatīns, kviešu dīgsti; kalcija ūdeņraža fosfāts, bezūdens. **LIETOŠANAS INDIKĀCIJAS:** Ērču invāzijas ārstēšanai (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes ricinus* un *Rhipicephalus sanguineus*). Šim veterinārajām zālēm ir tūlītēja un pastāvīga ērces iznīcinoša darbība vismaz 5 nedēļu garumā. Blusu invāzijas ārstēšanai (*Ctenocephalides felis* un *Ctenocephalides canis*). Šim veterinārajām zālēm ir tūlītēja un pastāvīga blusas iznīcinoša darbība vismaz 5 nedēļu garumā. Šīs veterinārās zāles var tikt lietotas kā daļa no ārstēšanas stratēģijas blusu alerģiskā dermatīta (BAD) kontrolei. Kašķa ērču (*Sarcoptes scabiei*) invāzijas ārstēšanai. Lai blusas un ērces tiktu pakļautas aktīvās vielas iedarbībai, tām jāsāk sūkt saimnieka asinis. **KONTRINDIKĀCIJAS:** Nelietot, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām. **BLAKUSPARĀDĪBAS:** Nav zināmas. **ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI:** Lai sarolaners sāktu iedarboties uz parazītiem, tiem jāsāk sūkt saimnieka asinis, tādējādi parazītu pārnēsātās slimības nevar tikt izslēgtas. **REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS:** Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, BELĢIJA. Detalizēta informācija ir arī pieejamam veterināro zāļu aprakstā, vai lūdzam sazināties ar Zoetis Baltic's +370 616 90353 vai baltic@zoetis.com