

## BOVIKALC BOLUS N4

Minerālvielu papildbarība govīm bolu veidā piena triekas riska samazināšanai.

**SASTĀVS:** ūdens 32,0%, kalcijs 22,3%, fosfors 0%, nātrijs 0%, magnijs 0%. 1 bols (190 g) satur 43 g kalcijs.

**IZEJVIELAS:** kalcijs sulfāts 27,0%, stearilcitrāts (E484) 7,0%.  
*Kalcija savienojumi:* kalcijs hlorīds 67,0%, kalcijs sulfāts (kā hemididrāts) 27,0%.

**LIETOŠANA UN DEVAS:** boli jāievada ar speciālo Bovikalc aplikatoru. Vienu Bovikalc bolu ievada uzreiz pēc atnešanās, otru – pēc 12 stundām.

### APLIKATORA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA:

1. Ievietot bolu aplikatorā ar noapaļotu galu vērstu uz priekšu.
2. Ar labo roku: Nostāties govij labajā pusē. Satvert govus augšējo žokli ar savu kreiso roku un pacelt galvu. Turēt govus galvu vērstu uz augšu un mazliet pret sevi.
3. Maigi ievadīt Bovikalc aplikatoru ar vienu Bovikalc bolu govij mutē. Kad sajūtīsiet pretestību, maigi vadiet aplikatoru pāri mēlei.
4. Kad Bovikalc aplikators govij mutē ir tik tālu, cik iespējams, nospiediet uz rokturi, lai atbrīvotu bolu. Izņemiet aplikatoru.

### BRĪDINĀJUMI:

Nedrīkst lietot govīm, kurām ir piena drudža klīniskās pazīmes vai guļošām govīm.

Nedrīkst lietot cietstāvošām govīm.

Ievērot laika intervālu starp devām.

Bovikalc jāievada tikai ar bolu aplikatoru. Neizmantot salauztus bolus. Nelietot pārmērīgu spēku, ievadot bolu.

**IEPAKOJUMS:** 4 × 190 gramī.

**RAŽOTĀJS:** Boehringer Ingelheim, Danmark A/S.

