

SPOTINOR 10 MG/ML

Šķīdums pilināšanai uz ādas liellopiem un aitām utu un mušu invāzijas ārstēšanai un novēršanai liellopiem; ērcu, utu, aitu kaulmušu un gaļas mušu invāzijas ārstēšanai un novēršanai aitām, kā arī utu un ērcu invāzijas ārstēšanai un novēršanai jēriem.

Liellopiem: grauzējutu un sūcējutu invāzijas ārstēšanai un novēršanai, tai skaitā *Bovicola bovis*, *Solenopotes capillatus*, *Linognathus vituli* un *Haematopinus eurysternus*, gaļas un piena liellopiem. Arī kā palīgīdzeklis sīvo mušu un mušu invāzijas ārstēšanai un novēršanai, tai skaitā *Haematobia irritans*, *Stomoxys calcitrans*, *Musca* spp. un *Hydrotaea irritans*.

Aitām: ērcu *Ixodes ricinus* un utu (*Linognathus ovillus*, *Bovicola ovis*), aitu kaulmušu (*Melophagus ovinus*) un gaļas mušu (parasti *Lucilia* spp) invāzijas ārstēšanai un novēršanai.

Jēriem: ērcu *Ixodes ricinus* un utu *Bovicola ovis* invāzijas ārstēšanai un novēršanai.

SASTĀVS:

Aktīvā viela: Deltametrīns 10 mg

LIETOŠANA: Uzlejiet vienu devu ar speciālo saspiežamo dozatoru vai aplikatoru uzliešanai vienā punktā uz mugurkaula viduslīnijas plecu līmenī. Gaļas mušu uzlidojuma aitām skatīt tālāk specifisko indikāciju norādījumus.

Utis liellopiem: vienā lietošanas reizē parasti tiks iznīcinātas visas utis. Pilnīga visu utu iznīcināšana var ilgt 4-5 nedēļas, kuru laikā utis izšķīļas no oliņām un tiek nogalinātas. Ļoti maz utu var izdzīvot uz nelielas dzīvnieku daļas.

Mušas liellopiem: sīvo mušu un mušu invāzijas ārstēšanai un novēršanai. Dominējot ragu mušām, invāzijas ārstēšana un novēršana ilgst 4-8 nedēļas. Mušu invāzijas ārstēšanu nedrīkst atkārtot 4 nedēļu laikā.

Ērces aitām: lietošana punktā starp lāpstīņām nodrošinās ērcu invāzijas ārstēšanu un novēršanu, kas piesūkušās dzīvniekiem jebkurā vecumā, līdz 6 nedēļām pēc ārstēšanas.

Aitu kaulmušas un utis: lietošana punktā starp lāpstīņām aitām ar īsu vai garu vilnu samazinās grauzējutu un aitu kaulmušu sastopamību 4-6 nedēļas pēc ārstēšanas.

lesaka:

- ārstēt neilgi pēc vilnas cirpšanas (dzīvniekiem ar īsu vilnu),
- ārstētās un neārstētās aitas nodalīt, lai izvairītos no atkārtotas invāzijas.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 17 dienas.

Pienam: nulle stundas.

Aitām:

Gaļai un blakusproduktiem: 35 dienas.

Pienam: Nav reģistrēts lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

IEPAKOJUMS: 250 ml un 500 ml pudele

RAŽOTĀJS: Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP Co. Down, Ziemeļīrija

