

Flubenol KH 44 mg/ml pasta iekšķīgai lietošanai suņiem un kaķiem

Invadētu suņu un kaķu ārstēšanai. Flubenol KH darbojas pret:

- cērmēm - *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*;
- ankilostomām - *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Ancylostoma tubaeforme*;
- matgalvjiem - *Trichuris vulpis*;
- lenteņiem - *Taenia pisiformis*, *Hydatigera taeniaeformis*.

SASTĀVS: 1 ml pastas satur: **Aktīvā viela:** Flubendazols 44 mg

DEVAS:

1 ml/2 kg ķermeņa svara = 22 mg/kg ķermeņa svara.

Suņiem un kaķiem, kas invadēti tikai ar cērmēm un ankilostomām: 1 ml pastas/2 kg ķermeņa svara vienu reizi dienā 2 dienas pēc kārtas.

Suņiem un kaķiem ar jauktām tārpu invāzijām: 1 ml pastas/2 kg ķ.s. vienu reizi dienā 3 dienas pēc kārtas.




LIETOŠANA:

Pastu var ievadīt vienā no zemāk minētajiem veidiem:

- pareizā deva tiek ievadīta tieši kaķa vai suņa mutē;
- pareizā deva tiek sajaukta ar barību (šis veids tiek ieteikts agresīviem dzīvniekiem vai dzīvniekiem, ar kuriem grūti apieties).

Noņemiet drošības uzgali (3). Pieturiet virzuli (1), griežot gredzenu (2) pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tas ir sasniedzis atzīmi, kas rāda dzīvnieka svaru kilogramos. Nākamajā reizē pievienojiet dzīvnieka svaru tam skaitlim, kurā gredzens (2) tika nostādīts iepriekšējā reizē, un tad grieziet gredzenu, līdz tiek sasniegta jaunā atzīme un deva (piemēram: 3 kg smagam kaķim gredzens ir ticis noregulēts līdz 3 kg atzīmei pirmajā reizē, 6 kg nākamajā un 9 kg trešajā reizē).



Ieteikumi standartveida ārstēšanai:

Suņi:	- kucēni	apmēram 1 - 2 nedēļu vecumā
	- jauni suņi	zīdīšanas periodā un tad katrus 2 - 3 mēnešus
	- kucēs	meklēšanās laikā - 10 dienas pirms un 10 dienas pēc dzemdībām
	- pieauguši suņi	3 - 4 reizes gadā
Kaķi:	- visi suņi	pirms vakcinācijas
	- kaķēni	6 nedēļu vecumā
	- jauni kaķi	katrus 2 - 3 mēnešus
	- pieauguši kaķi	3 - 4 reizes gadā
	- visi kaķi	pirms vakcinācijas



Viena šļirce, kas satur 7,5 ml, ir pietiekama, lai ārstētu 5 kg smagu dzīvnieku, kuram ir jaukta tārpu invāzija, 3 dienas pēc kārtas.

Flubenol KH pastu var lietot laktējošiem un grūsniem dzīvniekiem.

IEPAKOJUMS: 7,5 ml pastas, kas iepildīta plastikāta 7,8 ml injektorā un ievietota kartona kastītē.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas - 5 dienas.

REGISTRACIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: Eli Lilly Regional Operations GmbH, Austrija.

Bezrecepšu veterinārās zāles.