

## NEPOREX 2 SG



**Neporex 2 SG ūdenī šķīstošas granulas.  
Kukaiņu attīstības regulators mušu kāpuru kontrolei.**

### Sastāvs:

2 g/100 g ciromazīna (CAS Nr 66215-27-8)

### Darbības veids :

Neporex 2 SG darbojas kā kukaiņu attīstības regulators un ietekmē mušu kāpuru ādas mešanas procesu. Tas neiznīcina pieaugušas mušas. Pieaugušo mušu populācijas iznīcināšana notiek pakāpeniski, un tā kļūst saskatāma nedēļu vai divas pēc lietošanas. Lai ātrāk samazinātu pieaugušo mušu populāciju, ieteicama vienlaicīga insekticīda, kas iznīcina tikai pieaugušas mušas, lietošana.

### Lietošanas instrukcija:


- Preparāts piemērots sausai izkaisīšanai, izsmidzināšanai un aplaistīšanai. Ieteicamā deva ir 0,5 g aktīvās sastāvdaļas uz m<sup>2</sup> neatkarīgi no lietošanas veida.
- **Sausā izkaisīšana:** izkaisīt Neporex 2 SG tieši un vienmērīgi mušu vairošanās vietās. Sauso izkaisīšanu lietot tikai mitru vai šķidru kūtsmēsļu gadījumā.
- **Izsmidzināšana:** rūpīgi sajaukt norādīto Neporex 2 SG daudzumu ar atbilstošu ūdens daudzumu. Izsmidzināt mušu vairošanās vietās ar uz muguras nēsājamo izsmidzinātāju vai automātisku izsmidzināšanas aprīkojumu.
- **Aplaišīšana:** rūpīgi sajaukt norādīto Neporex 2 SG daudzumu ar atbilstošu ūdens daudzumu. Izliet vienmērīgi mušu vairošanās vietās ar lejkannu.
- **Vispārīgs ieteikums: pirms lietošanas noteikt mušu vairošanās vietas un apstrādāt visas vairošanās vietas vienlaicīgi. Neporex 2 SG lieto tikai mušu vairošanās vietās. To nav paredzēts lietot mušu nosēšanās vietās (uz sienām, griestiem utt.), jo tas neiedarbojas pieaugušām mušām.**
- **Ieteicamais apstrādes intervāls** ir atkarīgs no saimniecības un apbūves sistēmas, kā arī klimata apstākļiem. Tas var svārstīties no 2-3 nedēļām līdz vairākiem mēnešiem. Konkrētāki ieteikumi ir sniegti tālāk ietvertajos lietošanas grafikos.

### Brīdinājums:

- Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
- Atlikušo maisījumu nedrīkst izmest dīķos, upēs un kanalizācijas sistēmās.

### Atbrīvošanās no preparāta un tā iepakojuma:

Iznīcināt piesārņotos konteinerus un atlikušo produktu ķīmiskām vielām paredzētā atkritumu dedzināmajā krāsnī.



## Lietošanas grafiki:

### Liellopu mītnes

<p><b>Dziļie pakaiši.</b> Apstrādāt aptuveni 50 cm platu daļu gar sienām un ap un zem konstrukcijām, kur pakaišus nenoblietē dzīvnieki, apstrādāt malas un izšļakstīšanās vietas ap silēm un dzirdnēm un vietās, kur uzkrājas kūtsmēsli.</p> <p><b>Liellopu būros ārpus telpām</b> apstrādāt visu virsmu. Izsmidzināt vai aplaistīt ar Neporex 2 SG aptuveni 3 dienas pēc mēslu izvākšanas un atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti mušu kāpuri.</p>	<b>Neporex 2 SG daudzums 10 m<sup>2</sup> platībai</b>	
	Aplaistīšana 250 g/7,5 l ūdens	Izsmidzināšana 250 g/2,5 l ūdens
<p><b>Liellopi uz sietveida grīdas.</b> Tūlīt pēc mēslu iztīrīšanas apstrādāt visu grīdu. Atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti mušu kāpuri.</p>	<b>Neporex 2 SG daudzums 10 m<sup>2</sup> platībai</b>	
	Sausa izkaisīšana 250 g	

### Cūku mītnes

<p><b>Sietveida grīda.</b> Tūlīt pēc mēslu iztīrīšanas apstrādāt visu grīdu. Atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti mušu kāpuri.</p> <p><b>Vienotas partijas apstrādes sistēma.</b> Ieteicams apstrādāt ar izkaisīšanu tūlīt pēc tīrīšanas un pirms cūku ieviešanas.</p> <p><b>Dziļie pakaiši.</b> Izsmidzināt vai aplaistīt aptuveni 3 dienas pēc mēslu izvākšanas un atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti mušu kāpuri. Apstrādāt visu virsmu, kur atradās mēsli, un mitras vietas ap silēm un dzirdnēm.</p>	<b>Neporex 2 SG daudzums 10 m<sup>2</sup> platībai</b>		
	Sausa izkaisīšana 250 g	Aplaistīšana 250 g/7,5 l ūdens	Izsmidzināšana 250 g/2,5 l ūdens

### Mājputnu mītnes

<p>Apstrādāt ar Neporex 2 SG visu virsmu, kur atradās mēsli, aptuveni vienu nedēļu pēc mēslu izvākšanas. Atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti mušu kāpuri.</p>	<b>Neporex 2 SG daudzums 10 m<sup>2</sup> platībai</b>		
	Mitri pakaiši	Sausi pakaiši	
	Sausa izkaisīšana 250 g	Aplaistīšana 250 g/7,5 l ūdens	Izsmidzināšana 250 g/2,5 l ūdens

### Citi lauksaimniecības objekti

Parasti Neporex 2 SG lieto mušu vairošanās vietās 1–3 dienu laikā pēc vairošanās materiāla izveidošanās. Otrā apstrāde tiek veikta 2 nedēļas vēlāk.