

**BENESTERMYCIN SUSP IMM 5ML C.GOVĪM N20\***

Balta vai gandrīz balta homogēna suspensija ievadīšanai tesmenī liellopiem.

**SASTĀVS:**

1 injektors (5 ml) satur:

*Aktīvās vielas:*

Penetamāts (hidroiodīda veidā) 100 mg,

Benetamīna penicilīns 280 mg,

Framicetīns (sulfāta veidā) 100 mg.

**LIETOŠANA:** subklīniskā mastīta ārstēšanai, sākoties cietstāvei, un jaunas tescmens bakteriālas infekcijas novēršanai piena govīm cietstāves periodā, ko izraisa pret penicilīnu un framicetīnu jutīgas baktērijas.

Vērtējuma kritēriji var būt mastīta esamība un šūnu skaita izmaiņas iepriekšējās laktācijas beigās, un kāda atzīta metode subklīniska mastīta noteikšanai (piemēram, Šalma mastīta tests) vai bakterioloģiska izmeklēšana.

**DEVAS:** vienreizēja ievadīšana visos tesmeņa ceturkšņos pēc pēdējās slaukšanas pirms cietlaišanas. 100 mg penetamāta hidroiodīda, 280 mg benetamīna penicilīna un 100 mg framicetīna sulfāta atbilst viena *Benestermycin* injektora saturam ievadīšanai vienā tesmeņa ceturksnī. Tieši pirms ārstēšanas rūpīgi izslaukt visus tesmeņa ceturkšņus. Notīrīt pupu galus ar dezinficējošu līdzekli, tad katrā tesmeņa ceturksnī ievadīt viena *Benestermycin* injektora saturu, kas iepriekš sasildīts līdz istabas temperatūrai. Pēc ārstēšanas tesmeni neslaukt. Zāles nedrīkst iemasēt tesmenī.

**IEROBEŽOJUMI:**

Gājai un blakusproduktiem - 8 dienas.

Pienam: - ja ārstēšana notikusi vismaz 35 dienas pirms dzemdībām, pienu nedrīkst lietot 36 stundas pēc dzemdībām; ja ārstēšana notikusi mazāk nekā 35 dienas pirms dzemdībām, pienu nedrīkst lietot 37 dienas pēc dzemdībām.

**IEPAKOJUMS:** 20 polietilēna injektori. Viens injektors satur 5 ml suspensijas ievadīšanai tesmenī.

**RAŽOTĀJS:** Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Binger str. 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Vācija.

Recepšu veterinārās zāles

\*Detalizētu informāciju skatīt PVD mājas lapā

