



Librela 5 mg šķīdums injekcijām suņiem
 Librela 10 mg šķīdums injekcijām suņiem (pagaidām nav pieejams)
 Librela 15 mg šķīdums injekcijām suņiem
 Librela 20 mg šķīdums injekcijām suņiem
 Librela 30 mg šķīdums injekcijām suņiem

SASTĀVS: Katrs 1 ml flakons satur 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg vai 30 mg bedinvetmaba*.

*suņu monoklonālā antiViela, kas iegūta ar rekombinantu tehnoloģiju palīdzību Ķīnas kāmja olnīcu (ĶKO) šūnās.



INDIKĀCIJAS: Ar osteoartrītu saistītu sāpju mazināšanai suņiem.

Darbības mehānisms

Bedinvetmabs ir suņu monoklonālās antiVielas (mAb), kas iedarbojas uz nervu augšanas faktoru (NGF). Ir pierādīts, ka NGF mediēto šūnu signālu inhibīcija samazina sāpes, kas saistītas ar osteoartrītu.

DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS: Subkutānai lietošanai.

Devas un ārstēšanas shēma:

Ieteicamā deva ir 0,5–1,0 mg/kg ķermeņa svara, vienreiz mēnesī.

Suņiem, kas sver <5,0 kg:

Aseptiski ievilkt 0,1 ml/kg no viena 5 mg/ml flakona un ievadīt subkutāni.

Suņiem no 5 līdz 60 kg ievadīt visu flakona saturu (1 ml) saskaņā ar tabulu zemāk:

Suņa ķermeņa svars (kg)	Librela stiprums (mg), kas jāievada				
	5	10	15	20	30
5,0-10,0	1 flakons				
10,1-20,0		1 flakons			
20,1-30,0			1 flakons		
30,1-40,0				1 flakons	
40,1-60,0					1 flakons
60,1-80,0				2 flakoni	
80,1-100,0				1 flakons	1 flakons
100,1-120,00					2 flakoni

Suņiem, kuru ķermeņa svars pārsniedz 60 kg, vienas devas ievadīšanai nepieciešams vairāk nekā viena flakona saturs. Šādos gadījumos no katra nepieciešamā flakona saturu ievilkt vienā šļircē un ievadīt ar vienu zemādas injekciju (2 ml).

IEPAKOJUMS: I tipa caurspīdīga stikla flakoni ar fluorbutila gumijas aizbāzni.

Pieejamie izmēri: Kartona kastīte ar 2 flakoniem pa 1 ml.

Uzglabāt un transportēt atdzesētu (2°C - 8°C).

Nesasadēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Sargāt no gaismas.

REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS:

Zoetis Belgium SA, Beļģija

Recepšu veterinārās zāles. EU/2/20/261/001-015

Pilnīga informācija pieejama pievienotajā lietošanas instrukcijā.

