


## Vienkāršs un ērts vakcinācijas kalendārs, izmantojot Bovela®.

Visiem 3 mēnešus veciem mājlopiem neatkarīgi no reproduktīvā stāvokļa.\*  
Viena vakcīna gadā.



\* Lai gan nav konstatēts, ka vakcinēšana būtu izraisījusi augļa inficēšanu ar vakcīnas vīrusu, šādu iespējamību nevajadzētu pilnībā izslēgt.  
Atbildīgajam veterinārārstam katru grūsnības laikā veikto vakcinēšanu būtu rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā, piemēram, mājlopa GVD imunoloģisko stāvokli, laiku no vakcinācijas līdz pārošanas/apsēklošanas brīdim, grūsnības perioda posmu un infekcijas risku

## Bovela®

Jaunākās paaudzes  
vakcīna aktīvas imunizācijas  
veidošanai pret GVD

\*Atbildīgajam veterinārārstam katru grūsnības laikā veikto vakcinēšanu būtu rūpīgi jāizvērtē, ņemot vērā, piemēram, mājlopa GVD imunoloģisko stāvokli, laiku no vakcinācijas līdz pārošanas/apsēklošanas brīdim, grūsnības perioda posmu un infekcijas risku.

Bovela liofilizāts un šķīdinātājs injekciju suspensijas pagatavošanai liellopiem. Katra (2 ml) deva satur: Liofilizāts: modificēts dzīvs GVDV\*-1 un modificēts dzīvs GVDV\*-2. Aktīvai imunizācijai no 3 mēnešu vecuma, lai mazinātu hipertermiju un govju virusālās diarejas vīrusa (GVDV-1 un GVDV-2) izraisītu leukocītu skaita samazināšanos, kā arī vīrusa izplatīšanos un GVDV-2 izraisītu virēmiju. Aktīvai liellopu imunizācijai pret GVDV-1 un GVDV-2, lai nepieļautu pastāvīgi inficētu teļu dzimšanu, kā cēlonis ir transplacentāla inficēšanās. Imunitātes sākums: 3 nedēļas pēc imunizācijas. Imunitātes ilgums: 1 gads. Intramuskulārai lietošanai. Ierobežojumu periods: Nulle dienas. Receptu veterinārās zāles. Reģistrācijas apliecības īpašnieks: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Vācija. Reģistrācijas apliecības numurs: EU/2/14/176/001-016. Izplatītājs: SIA „Magnum Veterinārija”, Ulbrokas 23, Rīga, tālr. 67160091

### Galvenie ieguvumi



#### Izcila iedarbība

- Unikāla L2D tehnoloģija
- Aizsardzība pret 1. tipa un 2. tipa GVD
- Imunitātes periods: 12 mēneši
- Novērš jaunu ar GVD pastāvīgi inficēto lopu dzimšanu



#### Pārlicinoša aizsardzība

- Katram mājlopam
- Visā ganāmpulkā
- Mājlopiem grūsnības periodā\*



#### Ērta lietošana

- No 3 mēnešiem
- Visiem mājlopiem neatkarīgi no reproduktīvā stāvokļa\*
- Tikai viena vakcīna gadā



Bovela®  
Vienkāršāka  
visa ganāmpulka  
aizsardzība

3 soļi govju virusālās  
diarejas (GVD) novēršanai



AHRC/VELA/191006

**BOVELA**

# 1. Ganāmpulka vakcinācija


Ar Bovela® tiek vakcinēti mājlopi, kas vecāki par 3 mēnešiem.

# 2. Ganāmpulka stāvokļa noteikšana

Pēc ganāmpulka vakcinēšanas vismaz reizi mēnesī tiek veikts diagnosticējošs ganāmpulka skrīnings, lai noteiktu iespējamo GVD izplatību.

# 3. Vīrusa izskaušana

Lai izskaustu GVD, ja ganāmpulkā noteikta tā klātbūtne, visi pastāvīgi inficētie (PI) mājlopi ir jānosaka un jālikvidē.



\*Izņemot govīs laktācijas periodā, ja kopiena PKR testa rezultāts bijis negatīvs.