

## Simparica TRIO™

## košļājamās tabletes suņiem

**INDIKĀCIJAS:**

Suņiem ar jauktu ārējo un iekšējo parazītu invāziju vai risku uz to. Veterinārās zāles ir indicētas vienīgi tad, ja lieto pret ērcēm vai blusām un kuņģa-zarnu trakta nematodēm vienlaikus. Veterinārās zāles nodrošina arī vienlaicīgu sirdstārpu slimības un angiostrongilozes kontroli.

Ektoparazīti:

- Ērcu invāzijas ārstēšanai. Veterinārajām zālēm ir tūlītēja un noturīga ērces nogalinošā iedarbība 5 nedēļas pret *Ixodes hexagonus*, *Ixodes ricinus* un *Rhipicephalus sanguineus* un 4 nedēļas pret *Dermacentor reticulatus*;
- Blusu invāzijas ārstēšanai (*Ctenocephalides felis* un *Ctenocephalides canis*). Veterinārajām zālēm ir tūlītēja un noturīga blusu nogalinošā iedarbība 5 nedēļas pret jaunām invāzijām;
- Veterinārās zāles var lietot kā daļu no ārstēšanas stratēģijas blusu alergiskā dermatīta (BAD) kontrolei.

Kuņģa-zarnu trakta nematodes:

Kuņģa-zarnu trakta apaļtārpu un āķtārpu invāzijas ārstēšanai:

- *Toxocara canis* nenobrieduši pieauguši (L5) un pieauguši īpatņi;
- *Ancylostoma caninum* L4 kāpuru stadija, nenobrieduši pieauguši (L5) un pieauguši īpatņi;
- *Toxascaris leonina* pieauguši īpatņi;
- *Uncinaria stenocephala* pieauguši īpatņi.

Citas nematodes:

- Sirdstārpu slimības kontrolei (*Dirofilaria immitis*);
- Angiostrongilozes kontrolei, samazinot invadēšanās līmeni ar nenobriedušiem *Angiostrongylus vasorum* pieaugušiem (L5) īpatņiem.

**SASTĀVS:**

Katra tablete satur: Aktīvās vielas:

Simparica Trio košļājamās tabletes	sarolaners (mg)	moksidektīns (mg)	Pirantels (embonāta veidā) (mg)
suņiem 1,25–2,5 kg	3	0,06	12,5
suņiem >2,5–5 kg	6	0,12	25
suņiem >5–10 kg	12	0,24	50
suņiem >10–20 kg	24	0,48	100
suņiem >20–40 kg	48	0,96	200
suņiem >40–60 kg	72	1,44	300

**LIETOŠANA:**

Iekšējai lietošanai.

Devā: Veterinārās zāles lietot devā 1,2–2,4 mg/kg sarolanera, 0,024–0,048 mg/kg moksidektīna un 5–10 mg/kg pirantela, saskaņā ar norādīto tabulu:

Ķermeņa svars (kg)	Tabletes stiprums 3mg/0,06mg/12,5mg	Tabletes stiprums 6mg/0,12mg/25mg	Tabletes stiprums 12mg/0,24mg/50mg	Tabletes stiprums 24mg/0,48mg/100mg	Tabletes stiprums 48mg/0,96mg/200mg	Tabletes stiprums 72mg/1,44mg/300 mg
1,25–2,5 kg	1					
>2,5–5 kg		1				
>5–10 kg			1			
>10–20 kg				1		
>20–40 kg					1	
>40–60 kg						1
>60 kg	Piemērota tablešu kombinācija					

Tabletes var lietot ar vai bez barības.

Simparica Trio tabletes ir ar garšu un, kad saimnieks piedāvā, lielākā daļa suņu tās labprāt apēd. Ja suns labprātīgi neapēd tableti, to var dot kopā ar barību vai ielikt sunim tieši mutē. Tabletes nesadalīt.

**Ārstēšanas shēma:**

Ārstēšanas shēmu balstīt uz veterināro diagnozi, vietējo epidemioloģisko situāciju un/vai citu teritoriju epidemioloģisko situāciju, kuras suns ir apmeklējis vai apmeklē. Ja, pamatojoties uz veterinārārsta viedokli, ir nepieciešama(-s) atkārtota(-s) zāļu ievadīšana(-s), jebkurai(-ām) turpmākai(-ām) lietošanai(-ām) ievērot minimālo 1 mēneša intervālu.

Zāles drīkst lietot suņiem, ja ērcu/blusu un kuņģa-zarnu trakta nematožu invāzijas ārstēšana ir indicēta vienlaikus. Ja nav jauktas invāzijas risks, lietot šaurāka spektra parazīticīdu.

**Blusu un ērcu invāzijas un kuņģa-zarnu trakta nematožu invāzijas ārstēšana:**

Veterinārās zāles var izmantot kā daļu no sezonālās blusu un ērcu invāzijas ārstēšanas (aizstājot ārstēšanu ar vienas aktīvās vielas zālēm blusu un ērcu invāzijas ārstēšanai) suņiem, kuriem vienlaikus ir diagnosticēta kuņģa-zarnu trakta nematodes invāzija. Vienreizēja terapija ir efektīva kuņģa-zarnu trakta nematožu invāzijas ārstēšanai. Pēc nematožu invāzijas terapijas blusu un ērcu invāzijas ārstēšanu turpināt ar zālēm, kas satur vienu aktīvo vielu.

**Sirdstārpu slimības un anģiostronģilozes kontrole:**

Vienreizēja lietošana novērš arī plaušu tārpu slimību (samazinot nenobriedušu pieaugušu (L5) *A. vasorum*) un sirdstārpu slimību (*D. immitis*) uz vienu mēnesi. Ja šīs zāles aizstāj citu plaušu tārpu vai sirdstārpu kontroles līdzekli, pirmo zāļu devu ievadīt mēneša laikā pēc pēdējās iepriekšējo veterināro zāļu devas. Endēmiskajās zonās suņiem plaušu tārpu un/vai sirdstārpu preventīva ārstēšana jāveic katru mēnesi. Sirdstārpu kontroli ieteicams turpināt vismaz 1 mēnesi pēc pēdējās saskarsmes ar odiem.

**CITA INFORMĀCIJA**

Ērces, kas ir uz dzīvnieka pirms zāļu lietošanas vai no jaunas invāzijas pēc zāļu lietošanas, tiek nogalinātas 48 stundu laikā.

Blusām šo zāļu iedarbība sākas 12–24 stundu laikā pēc pieķeršanās un saglabājas piecas nedēļas pēc zāļu ievadīšanas. Blusas, kas ir uz dzīvnieka pirms zāļu lietošanas, tiek nogalinātas 8 stundu laikā. Veterinārās zāles nogalina blusas pirms tās sāk dēt olas, tādējādi no blusām tiek pasargāta suņa apkārtējā vide.

**Iepakojumus:**

Tabletes ir iepakotas alumīnija folija/folijas blisteros, kas iepakoti ārējā kartona kastītē.

Latvijā pieejams katrs tablešu stiprums iepakojumos pa 3 tabletēm.

EU/2/19/243/002 (3 mg / 0,06 mg / 12,5 mg, 3 tabletes)

EU/2/19/243/005 (6 mg / 0,12 mg / 25 mg, 3 tabletes)

EU/2/19/243/008 (12 mg / 0,24 mg / 50 mg, 3 tabletes)

EU/2/19/243/011 (24 mg / 0,48 mg / 100 mg, 3 tabletes)

EU/2/19/243/014 (48 mg / 0,96 mg / 200 mg, 3 tabletes)

EU/2/19/243/017 (72 mg / 1,44 mg / 300 mg, 3 tabletes)

Recepšu veterinārās zāles.

Sīkākas ziņas par šīm veterinārajām zālēm ir atrodamas Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē (<http://www.ema.europa.eu/>).

**REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS:** Zoetis Belgium SA, BEĻĢIJA

