

Halofusol 0,5 mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai teļiem

SASTĀVS: Katrs ml satur:

Aktīvā viela: Halofuginons 0,50 mg. Atbilst 0,6086 mg halofuginona laktāta.
 Palīgviela(-s): benzoksābe (E210) 1,00 mg, tartražīns (E102) 0,03 mg
 Dzidrs, dzeltens šķīdums.

INDIKĀCIJAS:

Jaundzimušiem teļiem:

- Diarejas novēršanai, kuru ierosina diagnosticēta *Cryptosporidium parvum* saimniecībā, kurās iepriekš novērota kriptosporidioze.

Lietošanu uzsākt pirmo 24 līdz 48 stundu laikā pēc piedzimšanas.

- Diarejas mazināšanai, kuru ierosina diagnosticēta *Cryptosporidium parvum*.

Ārstēšanu uzsākt 24 stundu laikā pēc diarejas parādīšanās.

Abos gadījumos ir novērota samazināta oocistu izdalīšanās.

DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS: Iekšķīgai lietošanai teļiem pēc barošanas.

Deva: 100 µg halofuginona / kg ķermeņa svara (ķ.sv.) / vienu reizi dienā 7 dienas pēc kārtas, t.i. 4 ml veterināro zāļu / 20 kg ķ.sv. / vienu reizi dienā 7 dienas pēc kārtas.

Lai vienkāršotu ārstēšanu ar šīm veterinārajām zālēm, tiek piedāvāta vienkārša devu shēma:

- 35 kg < teļi ≤ 45 kg: 8 ml veterināro zāļu vienu reizi dienā 7 dienas pēc kārtas,
- 45 kg < teļi < 60 kg: 12 ml veterināro zāļu vienu reizi dienā 7 dienas pēc kārtas.

Vieglākiem vai smagākiem teļiem veikt precīzu devas aprēķināšanu (4 ml/20 kg).

Lai nodrošinātu pareizu devu, izmantot vai nu iepakojumā iekļauto dozēšanas sūkni, vai jebkuru citu iekšķīgai ievadīšanai piemērotu ierīci. Ja tiek izmantots iepakojumā iekļautais dozēšanas sūknis, nelietot to apgrieztu otrādi.

Rīkoties šādi:

- 1) Uzskrūvēt pudelei dozēšanas sūkni.
- 2) Noņemt sprauslas aizsargvāciņu.
- 3) Ja dozēšanas sūknis tiek lietots pirmo reizi (vai ja tas vairākas dienas nav lietots), uzmanīgi sūknēt šķīdumu, līdz sprauslas galā ir izveidojies neliels šķīduma piliens.
- 4) Nofiksēt teļu un ievietot dozēšanas sūkņa sprauslu teļa mutē.
- 5) Pilnībā nospiež dozēšanas sūkņa mēlīti, lai ievadītu devu, kas atbilst 4 ml šķīduma. Lai ievadītu nepieciešamo daudzumu (attiecīgi 8 ml 35–45 kg smagiem teļiem un 12 ml 45–60 kg smagiem teļiem), nospiež dozēšanas sūkņa mēlīti attiecīgi divas vai trīs reizes.
- 6) Noskrūvēj dozēšanas sūkni no pudeles.
- 7) Noslēgt pudeli ar uzskrūvējamu vāciņu.
- 8) Nospiež dozēšanas sūkņa mēlīti divas vai trīs reizes, lai iztukšotu no sūkņa atlikušās zāles.
- 9) Uzlikt sprauslas aizsargvāciņu.

Turpmāku ārstēšanu veikt katru dienu vienā un tai pašā laikā.

Tiklīdz tiek ārstēts pirmais teļš, visus nākamajos jaundzimušos teļus sistemātiski ārstēt tik ilgi, kamēr pastāv *C. parvum* izraisītas diarejas risks.

IEROBEŽOJUMU PERIODS: Gaļai un blakusproduktiem: 13 dienas.

IEPAKOJUMS: Kartona kastīte ar vienu 500 ml pudeli un 4 ml dozēšanas sūkni.
 Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: LABORATORIOS KARIZOO, S.A. Spānija

Recepšu veterinārās zāles. V/DCP/20/0029

Pilnīga informācija pieejama pievienotajā lietošanas instrukcijā.

