

## ŠĶIDRĀS PAPILDBARĪBAS GOVĪM

| PRODUKTS  | SASTĀVDAĻAS   | LIETOŠANA   |
|---|---|---|
|  <p><b>ANIONIC 500ml</b><br/>Minerālā papildbarība slaucamām govīm – samazina pēcdzemdību paralīzes risku. Lieto pēcdzemdību paralīzes un hipokalciēmijas gadījumos. Atjauno katjonu-anjonu līdzsvaru. Ērta gēla veidā.</p>  | <p>Kalcija hlorīds, bezūdens magnija sulfāts, kālija hlorīds, magnija fosfāts, propilēnglikols, monokalcijs fosfāts.</p> <p>ANALĪTISKIE KOMPONENTI: mitrums 72,6%, koppelni 20,9%, kopproteīns &lt; 0,1%, kokšķiedra &lt; 0,1%, koptauki &lt; 0,1%, hlorīdi (85 g/l) 7,1%, kālijs (30 g/l) 2,7%, kalcijs (30 g/l) 2,5%, magnijs (20 g/l) 1,7%, sērs (20 g/l) 1,7%, nātrijs (13 g/l) 1,7%, fosfors (10 g/l) 1,2%.<br/>Metaboliskā enerģija 750 MJ/pudelē.</p>  | <p>Iekšķīgi 1 pudele vienai govij dienu pirms un atnešanās dienā.</p>   |
|  <p><b>CALCIUM 500ml</b><br/>Diētiska papildbarība slaucamām govīm. Samazina pēcdzemdību paralīzes risku. Kalcijs piena triekas un hipokalciēmijas riska mazināšanai.</p>   | <p>Magnija hlorīds, monokalcijs fosfāts, propilēnglikols.</p> <p>ANALĪTISKIE KOMPONENTI: mitrums 53,6%, koppelni 29,6%, koptauki &lt;0,1%, kopproteīns &lt;0,1%, kokšķiedra &lt;0,1%, kopējais kalcijs (100g/L) 7,5%, kalcija formiāts 5,7%, kalcija fosfāts 1,8%, fosfors (40g/L) 3,0%, magnijs (30g/L) 2,3%, nātrijs (16g/L) 1,5%.</p> <p>Uzturfizioloģiskās piedevas uz 1L: mangāns (3b501 mangāna hlorīds, tetrahidrāts) 200mg, jods (3b201 kālija jodīds) 80mg, selēns (3b801 nātrija selenīts) 7mg.</p> | <p>Iekšķīgi lietošanai. Pirms lietošanas labi sakratīt. Govīm - 1 pudele no rīta un 1 pudele vakarā 1 dienu pirms atnešanās. Pārlicināties, ka tiek norīts. Var dot Calcium 2 dienas pēc atnešanās.</p> |
|  <p><b>PHOSPHORE 500ml</b><br/>Papildbarība slaucamām govīm – lieto pēc kuņģa dislokācijas, ketozes, paraplegijas. Hipofosfatēmiju var izraisīt hipokalciēmija vai apetītes zudums. Lieto fosfora trūkuma gadījumos.</p>   | <p>Dikālija fosfāts, magnija fosfāts, propilēnglikols.</p> <p>ANALĪTISKIE KOMPONENTI: mitrums 72%, koppelni 25%, kopproteīns &lt;0,1%, kokšķiedra &lt;0,1%, koptauki &lt;0,1%, fosfors (100g/l) 7,8%, kālijs (100g/l) 7,8%, magnijs (10g/l) 0,8%, nātrijs &lt;0,1%.</p>   | <p>Sakratīt pirms lietošanas. Iekšķīgi 1 pudele vienai govij, atkārtot pēc 12 stundām līdz 3 reizēm pēc nepieciešamības.</p>  |
|  <p><b>POTASSIUM 500ml</b><br/>Papildbarība slaucamām govīm – samazina hipokalēmijas risku. Lieto enerģijas metabolisma traucējumu gadījumos. Pie apetītes zuduma, caurejas, meklēšanās stresa. Apetītes zudums var izraisīt hipokalēmiju, kas savukārt izraisa insulīnizturīgu hiperglikēmiju, kuņģa dislokāciju, paraplēģiju, muskuļu vājumu un trīci.</p> | <p>Kālija hlorīds, propilēnglikols, nātrija hlorīds.</p> <p>ANALĪTISKIE KOMPONENTI: mitrums 75,8%, koppelni 23%, kopproteīns &lt;0,1%, kokšķiedra 1,1%, koptauki &lt;0,1%, kālijs (130g/l) 11,8%, nātrijs (1,57g/l) 0,2%.</p>   | <p>Sakratīt pirms lietošanas. Iekšķīgi 1 pudele vienai govij un atkārtot pēc 12 stundām.</p>  |

**RAŽOTĀJS:** ražots Francijā pēc Vetexpert pasūtījuma.