

## CREDELIO košļājamās tabletes

### Lotinalers (*lotilanerum*)

#### SUŅIEM

Credelio 56 mg košļājamās tabletes suņiem (1,3–2,5 kg)  
 Credelio 112 mg košļājamās tabletes suņiem (>2,5–5,5 kg)  
 Credelio 225 mg košļājamās tabletes suņiem (>5,5–11 kg)  
 Credelio 450 mg košļājamās tabletes suņiem (>11–22 kg)  
 Credelio 900 mg košļājamās tabletes suņiem (>22–45 kg)

#### KAĶIEM

Credelio 12 mg košļājamās tabletes kaķiem (0,5–2,0 kg)  
 Credelio 48 mg košļājamās tabletes kaķiem (>2,0–8,0 kg)

#### Indikācijas:

##### Blusu un ērcu invāzijas ārstēšanai.

Šīs veterinārās zāles nodrošina tūlītēju un ilgstošu iedarbību uz blusām un ērcēm, kas ilgst **vienu mēnesi**. Lai blusas un ērces tiktu pakļautas aktīvās vielas iedarbībai, tām jāatrodas uz dzīvnieka un jāsūc tā asinis. Veterinārās zāles var lietot kā daļu no blusu alergiskā dermatīta (BAD) kontroles terapijas.

#### Lietošana:

Iekšķīgai lietošanai.

Veterinārās zāles ir jālieto atbilstoši tabulā norādītajam, lai nodrošinātu devu no 20 līdz 43 mg lotilanera/kg ķermeņa svara.

Suņa ķermeņa svars (kg)	Lietojamo tablešu stiprums un skaits				
	Credelio 56 mg	Credelio 112 mg	Credelio 225 mg	Credelio 450 mg	Credelio 900 mg
1,3–2,5	1				
>2,5–5,5		1			
>5,5–11			1		
>11–22				1	
>22–45					1
>45	Atbilstoša tablešu kombinācija				

Veterinārās zāles jālieto atbilstoši tabulā norādītajam, lai nodrošinātu devu no 6 līdz 24 mg lotilanera/kg ķermeņa svara.

Kaķa ķermeņa svars (kg)	Lietojamo tablešu stiprums un skaits	
	Credelio 12 mg	Credelio 48 mg
0,5–2,0	1	
>2,0–8,0		1
>8,0	Atbilstoša tablešu kombinācija	

Lietojiet veterinārās zāles kopā ar barību vai 30 minūtes pēc barības uzņemšanas.

#### Īpaši brīdinājumi:

Lai lotinalers iedarbotos uz parazītiem, tiem jāsūc dzīvnieka asinis; tādējādi nevar pilnībā izslēgt parazītu pārnēsāto slimību izplatīšanās risku.

Šīs zāles kucēniem līdz 8 nedēļu vecumam un ar ķermeņa svaru līdz 1,3kg, un kaķēniem līdz 8 nedēļu vecumam un ar ķermeņa svaru līdz 0,5 kg, jālieto tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Nav pierādīts šo veterināro zāļu nekaitīgums grūsnām un laktējošām kucēm un kaķenēm, un vaislas dzīvniekiem, tāpēc lietot tikai pēc ārstējošā veterinārārsta ieguvuma un riska attiecības izvērtēšanas.

Blusām (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) iedarbības sākums ir 4 stundu laikā pēc saskares ar zālēm, un zāļu iedarbība ilgst vienu mēnesi pēc lietošanas. Blusas, kas atrodas uz dzīvnieka pirms zāļu uzņemšanas, tiek iznīcinātas 6 stundu laikā.

Ērcēm (*Dermacentor reticulatus*, *Ixodes hexagonus*, *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) iedarbības sākums ir 48 stundu laikā pēc saskares ar zālēm, un zāļu iedarbība ilgst vienu mēnesi pēc lietošanas. Esošās I.ricinus ērces, kas atrodas uz dzīvnieka pirms zāļu uzņemšanas, tiek iznīcinātas 8 stundu laikā.

Blusām (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) iedarbības sākums ir 12 stundu laikā pēc saskares ar zālēm, un zāļu iedarbība ilgst vienu mēnesi pēc lietošanas. Blusas, kas atrodas uz dzīvnieka pirms zāļu uzņemšanas, tiek iznīcinātas 8 stundu laikā.

Ērcēm (*Ixodes hexagonus*) iedarbības sākums ir 24 stundu laikā pēc saskares ar zālēm, un zāļu iedarbība ilgst vienu mēnesi pēc lietošanas. Esošās ērces, kas atrodas uz dzīvnieka pirms zāļu uzņemšanas, tiek iznīcinātas 18 stundu laikā.

Recepšu veterinārās zāles. Reģ.nr. EU/2/17/206/001-021

