

DRAXXIN PLUS 10 mg/ml + 120 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem

tulathromycin / ketoprofen

SASTĀVS: Viens ml satur:	Aktīvās vielas: Tulatromicīns	100 mg
	Ketoprofēns	120 mg
	Palīgvielas: Monotioglicerīns	5 mg

Dzidrš, bezkrāsains līdz dzeltens/zāļi dzeltens šķīdums injekcijām bez redzamām daļiņām.

INDIKĀCIJAS: Liellopu elpceļu slimību (LES), kuras saistītas ar drudzi, kuru izraisījušas pret tulatromicīnu jutīgas *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* vai *Mycoplasma bovis*, ārstēšanai.

DEVAS UN LIETOŠANAS VEIDS: Subkutānai lietošanai.

Viena subkutāna injekcija devā 2,5 mg tulatromicīna/kg ķermeņa svara un 3 mg ketoprofēna/kg ķermeņa svara (atbilst 1 ml/40 kg ķermeņa svara). Lietojot liellopiem, kuru ķermeņa svars ir lielāks par 400 kg, sadalīt devu tā, lai vienā injekcijas vietā tiktu ievadīti ne vairāk kā 10 ml.

Lai nodrošinātu pareizu devu un izvairītos no nepietiekamas devas ievadīšanas, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Jebkuru elpceļu slimību gadījumā ieteicams dzīvniekus ārstēt agrīnās slimības stadijās un 48 stundu laikā pēc injekcijas novērtēt atbildes reakciju uz ārstēšanu. Ja saglabājas vai pastiprinās elpceļu slimību klīniskās pazīmes vai rodas slimības recidīvs, ārstēšanu mainīt, izmantojot citas antibiotikas, un tā jāturpina līdz klīnisko pazīmju izzušanai. Ja 24 stundas pēc ārstēšanas uzsākšanas saglabājas nemainīgi paaugstināta ķermeņa temperatūra, ārstējošajam veterinārārstam izvērtēt turpmākas pret drudža terapijas nepieciešamību.

Aizbāzņi caurdurt ne vairāk 20 reizes. Vienlaicīgi ārstējot atsevišķas dzīvnieku grupas, izmantot flakona aizbāzņi ievietotu adatu zāļu izvilkšanai vai automātisko šļirci, lai izvairītos no aizbāzņa pārmērīgas caurduršanas. Pēc zāļu lietošanas to izvilkšanai izmantoto adatu izņemt no aizbāzņa.

IEROBEŽOJUMU PERIODS: Gaļai un blakusproduktiem: 50 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai liellopiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Nelietot grūšņiem dzīvniekiem 2 mēnešus pirms gaidāmajām dzemdībām, ja šo dzīvnieku pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Iepakojumus: I tipa dzintarkrāsas stikla flakons ar hlorbutila gumijas aizbāzņi ar fluorpolimēra pārklājumu un alumīnija vāciņu. Kartona kastīte, kas satur vienu 100 ml flakonu.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 56 dienas.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS: Zoetis Belgium SA, BEĻĢIJA

Recepšu veterinārās zāles. V/DCP/20/0041

Pilnīga informācija pieejama pievienotajā lietošanas instrukcijā.

